Behandeling van huidkanker

De behandelingen op een rij en wat je kunt verwachten

Het doel van deze folder

Deze folder is voor mensen die behandeld worden voor huidkanker of een voorstadium. Je leest welke behandelingen er zijn, waar ze voor gebruikt worden en wat je kunt verwachten.

Hoe de keuze gemaakt wordt

Welke behandeling past, hangt af van het soort huidkanker, de plek, de grootte, je leeftijd en je gezondheid. Bij de meeste vormen is wegsnijden de eerste keus. Krijg je meer mogelijkheden, vraag dan naar het resultaat, de bijwerkingen, hoeveel afspraken het kost en hoe het er later uitziet.

Wegsnijden

Onder plaatselijke verdoving snijdt de arts de plek weg met een rand gezonde huid eromheen. De wond wordt gehecht. Het weefsel gaat naar het laboratorium. Soms is een tweede operatie nodig. Een litteken vervaagt in zes tot twaalf maanden, maar blijft altijd zichtbaar. Bescherm het litteken het eerste jaar tegen de zon. Lees meer op de pagina De operatie op onlinedermatologie.nl.

Mohs-chirurgie

De arts haalt de plek laagje voor laagje weg en bekijkt elk laagje meteen onder de microscoop. Zo blijft er zo veel mogelijk gezonde huid over. Dit gebeurt bij huidkanker in het gezicht met een hoog risico, of als het is teruggekomen. Het duurt een halve tot een hele dag.

Bevriezen

De arts spuit vloeibare stikstof op de plek. De huid wordt wit, daarna rood, en er kan een blaar komen. Na een tot twee weken valt het korstje eraf. Dit wordt gebruikt bij actinische keratose, een oppervlakkig basaalcelcarcinoom en de ziekte van Bowen. Prik een blaar niet open.

Wegschrapen en dichtbranden

Onder verdoving schraapt de arts de plek weg met een scherp lepeltje en brandt het wondje dicht. Dit kan bij een basaalcelcarcinoom met een laag risico op de romp.

Crèmes

Fluorouracil, imiquimod en tirbanibulin behandelen actinische keratosen, de ziekte van Bowen en een oppervlakkig basaalcelcarcinoom. De huid wordt tijdelijk rood, schilferig en soms open. Dat hoort erbij. Lees meer in de folder Crèmebehandeling van voorstadia.

Behandeling met licht

Bij fotodynamische therapie smeert de arts een crème op de huid en belicht die plek daarna met een lamp of met daglicht. Met een lamp doet het tijdens het belichten pijn. Met daglicht is het bijna pijnloos. Daarna is de huid een tot twee weken rood en schilferig.

Bestraling

Bestraling kan als opereren niet goed kan, vaak bij oudere mensen. Je komt meerdere keren. De huid kan rood worden en schilferen, en soms blijvend van kleur veranderen.

Bij gevorderde huidkanker

Is huidkanker uitgezaaid of zo ver gegroeid dat opereren niet kan, dan zijn er medicijnen. Bij het melanoom zijn dat immuuntherapie en doelgerichte therapie, in een melanoomcentrum. Bij het plaveiselcelcarcinoom immuuntherapie. Bij het basaalcelcarcinoom tabletten. Deze behandelingen hebben de vooruitzichten sterk verbeterd.

Neem contact op met je behandelaar bij:

- koorts, of een wond die steeds roder, warmer of pijnlijker wordt
- een wond die blijft bloeden
- een reactie op een crème die je niet vertrouwt
- twijfel of wat je ziet normaal is

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in deze folder juist is. Toch is niet elke behandeling geschikt of werkzaam voor iedereen. Je eigen arts kan je uitgebreider adviseren.

Samengesteld door dr. Annemie Galimont, dermatoloog, naar de NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen, de NVDV-richtlijnen Basaalcelcarcinoom, Plaveiselcelcarcinoom, Melanoom en Actinische keratose en het e-book Huidkanker ontcijferd. Uitgave: onlinedermatologie.nl, november 2026.